

# Straż Miejska w Łomiankach

<https://strazmiejska.lomianki.pl/sm/aktualnosci/14606,Komunikat-Burmistrza-Lomianek-dot-dystrybucji-jodku-potasu.html>  
26.04.2024, 00:11

## Komunikat Burmistrza Łomianek dot. dystrybucji jodku potasu.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informuję, że na terenie Gminy Łomianki utworzonych zostanie 8 punktów wydawania preparatu jodku potasu. Podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu:

1. ul. Parkowa 2 – budynek świetlicy
2. ul. Warszawska 73 – budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach
3. ul. Wiejska 12A – budynek Centrum Kultury
4. ul. Staszica 2 – budynek ICDS (sala gimnastyczna, wejście od ul. Warszawskiej)
5. ul. Partyzantów 31 – budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Łomiankach
6. ul. Por. Akinsa 6 – budynek Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym
7. ul. Strzelecka 35 – budynek Szkoły Podstawowej w Sadowej
8. ul. Rolnicza 435 – budynek Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Polskim

Wydanie preparatu w punktach wydawania nastąpi dopiero po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

W załączeniu charakterystyka preparatu jodku potasu oraz ulotka informacyjna.

### [Charakterystyka-jodek-potasu](#)

Komunikat Burmistrza Łomianek dot. dystrybucji jodku potasu.  
pdf, 96.22 KB, 04.10.2022

## DODATKOWE INFORMACJE



Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej [www.gov.pl/web/paa](http://www.gov.pl/web/paa)

Więcej o zaleceniach i przeciwwskazaniach stosowania jodku potasu

[rejestrmedyczne.ezdrowie.gov.pl](http://rejestrmedyczne.ezdrowie.gov.pl)



**JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻĄDANE ORAZ W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB FARMACEUTĄ!**



# PROFILAKTYKA JODOWA

## BROSZURA INFORMACYJNA

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie, tabletek zawierających wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasycy łącznie stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

- dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż.: 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)
- dzieci od 3 do 12 r.ż.: 1 tabletkę (50 mg jodu)
- dzieci od 1 miesiąca do 3 r.ż.: ½ tabletki (25 mg jodu)
- noworodki: ¼ tabletki (12,5 mg jodu)
- kobiety w ciąży i karmiące piersią: 2 tabletki (100 mg jodu)



## PAMIĘTAJ! ZWRÓĆ SIĘ O PORADĘ LEKARZA

- stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy
- występuje u Ciebie nieleczona autoimmunologiczna choroba tarczycy
- masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenie
- z tym związane
- przyjmujesz leki hamujące czynność tarczycy, leki moczopędne oszczędzające potas, a także kaptopril, enalapril lub chinidynę

## OSTRZEŻENIA I ŚRODKI UWAGI, JEŚLI:

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI UWAGI, JEŚLI:

## Kiedy nie przyjmować leku?

Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przelać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki. Tabletki można rozgryzać lub polkać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.



- jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
- jeśli masz nadczynność tarczycy
- jeśli masz zaburzenie naczyni krwionośnych (zapalenie naczyń i hipokomplesmentid)
- jeśli masz choroby autoimmunologiczne (opyszczkowe zapalenie skóry Dühringa)

[Poprzedni Strona](#)

[Następny Strona](#)